

# Avertissements agricoles



BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES POITOU-CHARENTES

GRANDES CULTURES

Bulletin n° 176 (04/90) du 9 Mars 1990

<b>CEREALES</b>	: Rouille brune et localement oïdium seront les maladies dominantes lors du premier traitements
<b>POIS</b>	: Réaliser rapidement les traitements sitones
<b>COLZA</b>	: Surveiller les méligèthes

## BLE

Stades : de la fin tallage dans les semis de décembre à 1 noeud dans les semis d'Octobre de la façade atlantique.

### Situation

#### ROUILLE BRUNE

Présente à des niveaux exceptionnellement élevés sur variétés sensibles (THESEE, BEAUCHAMP, FESTIVAL...), constitue le risque majeur de la campagne.

#### OIDIUM

Evolution variable selon les situations. Très développé dans les variétés sensibles (RECITAL, PERNEL, FESTIVAL...).

#### ROUILLE JAUNE

Non encore observée mais devrait apparaître courant montaison à la faveur d'une période pluvieuse.

#### PIETIN VERSE

Observé à de faibles fréquences actuellement, une légère progression des symptômes devient intervenir dans les 15 jours à venir.

#### SEPTORIOSE

Peu observée actuellement. Evolution déterminée par la pluviométrie courant montaison.

### Préconisation

Une intervention polyvalente contre les maladies du pied et surtout des feuilles (rouilles, oïdium et septoriose) est à prévoir dès le stade 1 noeud dans les blés levés en Octobre et Novembre.

Cette intervention pourra être reportée au stade 2 noeuds - sortie dernière feuille dans les levées de décembre. Privilégier l'efficacité rouille brune sur les variétés THESEE, BEAUCHAMP et FESTIVAL, et l'efficacité oïdium sur les variétés RECITAL et PERNEL.

.../...

P5



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt  
SERVICE RÉGIONAL  
DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
13, Rte de la Forêt - BIARD  
86000 POITIERS Tél. : 49.58.39.02

Publication périodique - Imprimerie de la Station Poitou-Charentes  
Directeur Gérant : J. P. PIQUEMAL  
CPPAP n° 1664 A.D. Abonnement annuel :  
Chèque bancaire ou postal à l'ordre du  
sous régisseur de recettes Avertissements Agricoles

Utilisation des Herbicides

La végétation des céréales étant anormalement précoce bien vérifier le stade de la céréale avant tout traitement herbicide. **Ne plus utiliser de chlortoluron**, l'utilisation de **produits à base d'isoproturon** n'est plus possible sauf dans les parcelles les plus tardives, se méfier des habitudes de traitement à date fixe, elles sont dangereuses en année normale, **elles seront fatales à votre céréale en 1990.**

**ORGE****MALADIES**Situation

Rouille naine et helminthosporiose sont toujours bien implantées, légère stagnation de l'oïdium.

Préconisation

Prévoir une intervention sur ces 3 maladies au stade 1 noeud.

**JAUNISSE NANISANTE**Situation

Des symptômes de la maladie sont observables actuellement.

De nouveaux symptômes devraient apparaître, les pucerons ayant été en activité tout l'hiver dans les parcelles infestées à l'automne. Les dégâts seront comparables à 1989 dans les parcelles non protégées.

**POIS**

Stade début levée à 3 feuilles pour les semis les plus précoces.

**SITONES**Situation

Activité déjà notable, surtout sur les semis les plus précoces.

L'activité la plus importante est observée en Charente Maritime et Charente.

Compte tenu de la précocité d'attaque, **le risque est élevé.**

Préconisation

Vous observez seulement quelques rares morsures (ou aucune) sur les premières feuilles = Ne pas intervenir pour l'instant.

Vous observez sur **toutes les premières feuilles des morsures** de sitones (encoches semi-circulaires) = Intervenir rapidement en utilisant un des produits cités ci-dessous. Ce dernier cas est déjà observé.

**Insecticides sitones :**

- DECIS 0,25 l/ha
- SUMICIDIN 0,4 l/ha
- TRACKER 0,08 l/ha
- KARATE 0,12 l/ha.

.../...

## COLZA

Stades D1 (boutons accolés encore cachés à E (boutons séparés). Les tiges ont atteint une longueur de 20 cm dans de nombreux cas.

## CHARANCON DE LA TIGE

Situation

Des dégâts de ponte sont observés dans les parcelles non protégées.

Préconisation

Dans les parcelles ayant atteint le stade tige 20 cm, il est trop tard pour intervenir. Dans les autres, vous pouvez encore le réaliser en sachant que l'efficacité du traitement sera limitée (nombreuses pontes déjà déposées).

## MELIGETHES

Situation

Captures importantes en cuvette jaunes. Temps favorable à l'activité au champ.

Préconisation

Surveillez tout particulièrement les parcelles aux stades D1-D2 (boutons accolés) et intervenir si vous observez un méligèthe par inflorescence.

**Remarque :** Les traitements charançons de la tige réalisés avec un pyrèthrinoïde vous protégeront des méligèthes pendant 10 à 15 jours.

A partir du stade E (boutons séparés), les seuils d'intervention de 2 à 3 méligèthes par inflorescence sont difficilement atteints dans notre région.

## CAMPAGNOLS

Les résultats de piégeages effectués au cours de l'hivers 1989/1990 apparaissent dans le tableau qui suit :

Secteur	Dates des piégeages	Densité/ha (moyenne du secteur)	Indices reproduction	
			Mâles	Femelles
Aiffres/Chizé	Déc. 89	9,5	77 %	40 %
Saint Amand de Boixe	"	5,0		
Aulnay/Cherves	"	4,0	8 %	
Lezay/Chaunay	"	24,0	63 %	75 %
Lusignan/Couhé	"	15	18 %	33 %
Thouars/Thénezay	"	35	9,5 %	6 %
Beauvoir/Coivert - Usseau	Janv. 90	4	0 %	0 %
Sauzais Vaussais/Gençay	"	20	33 %	14 %
Marans	"	31	12 %	8 %
Villiers/Echiré	"	17	56 %	75 %
Marans	Févr. 90	23	71 %	50 %
Archigny	"	50	87 %	40 %

.../...

76

Les densités moyennes sont faibles. A l'exception du secteur d'Archigny et, ponctuellement, de quelques prairies temporaires (sites précisés ci-dessous), il n'y a pas de risques de remontée dangereuse des densités pour les 4 à 5 mois à venir.

#### **Secteur d'Archigny**

Des densités élevées sont relevées dans de nombreuses prairies temporaires (fétuques, RGI, luzernes, trèfle) 40 à 50 % de ces milieux, où des signes importants d'activité sont observés, mériteraient d'être traités maintenant.

#### **Prairies temporaires à risques**

Quelques prairies temporaires étaient fortement peuplées au moment des piègeages hivernaux :

- Sud du secteur de Thouars (Assais - Les Jumeaux - Borcq - Thenezay) ;
- Quelques fétuques en RGI sur le secteur de Sauzé-Vaussais / Gençay / Couhé. Localement des interventions apparaissent justifiées dans ces milieux.

**(C) SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX**  
*Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation.*